



**Magendarm Thalwil AG**  
**Fachärzte für Magen- und Darmkrankheiten FMH**  
**Zürcherstrasse 61, 8800 Thalwil, Tel 044 720 34 35**  
**praxis@magendarm-thalwil.ch**

## **Hoja informativa para pacientes con hemorroides**

Hoy he comenzado a realizarle el tratamiento de hemorroides mediante ligadura con bandas elásticas. Se ha colocado un pequeño anillo de goma alrededor de la hemorroide interna (estrangulándola). Después de 2 a 5 días, ésta se caerá, lo cual generalmente no notará.

### **Lo que debe saber:**

Inmediatamente o unas pocas horas después del procedimiento, puede aparecer una sensación incómoda de urgencia para evacuar. Esto generalmente solo dura entre 24 y 36 horas, aunque en raras ocasiones puede llegar a ser doloroso.

En los primeros días después de la ligadura, puede presentarse un leve sangrado al evacuar. Esto no debe preocuparle.

**No obstante, en caso de que ocurriera un sangrado intenso, independientemente de las deposiciones, debe llamarnos de inmediato:**

**Consultorio: 044 720 34 35**  
**Móvil: 079 158 49 53**  
**FAX: 044 720 34 38**

En caso de que no pueda comunicarse con nosotros, diríjase a la Emergencia del hospital más cercano.

Los siguientes analgésicos están permitidos: **Ponstan o Panadol**

**Atención: ¡muy importante!**

**Durante todo el tratamiento y hasta 4 semanas después de su finalización, no deben tomarse medicamentos que contengan ácido acetilsalisílico, como por ejemplo:**

Alcacyl, Alka-Seltzer, Asasantin, Aspégic, Aspirina, Aspro 500, Colfarit, Contra-Schmer, Enterosarine, Febradolor, Fortalidon, Fribagyl, Malex, Neo-Cibalgin, Plavix, Rhonal, Robaxisal, Silentan, Synthol, Thomapyrin, Togonal ASS 300, Togonal ASS iC., Treupel, Triplex, Upsalgin C, Tiatral, Rumatral, Lyman Tabs. u.a.

**¡Estos medicamentos pueden ocasionar un sangrado serio tan sólo con la toma de 1 comprimido!**