

**MAGENDARM THALWIL AG**

Spezialärzte Gastroenterologie, Zürcherstrasse 61, 8800 Thalwil  
Tel. 044 720 34 35 / FAX 044 720 34 38  
praxis@magendarm-thalwil.ch

## **Formulario para pacientes con polipectomía**

Durante la colonoscopia realizada en el día de hoy le hemos extraído un pólipo. Dicha extracción se realizó a través de una resección por ligadura. En este contexto, es importante saber lo siguiente:

Luego de la realización de esta intervención, puede presentar un leve sangrado que no debe preocuparle. **No obstante, en caso de que ocurriera un sangrado intenso, independientemente de las deposiciones, deberá notificarnos de inmediato.**

**Puede contactarnos en los siguientes números:**

**Consultorio            044 720 34 35**

**Móvil                    079 158 49 53**

En caso de no lograr contactarse a dichos números, diríjase a la Emergencia del hospital más cercano o notifique a su médico de cabecera, quien ya debería estar en conocimiento de este procedimiento.

**En caso de ser necesario, puede tomar estos analgésicos:**

**Ponstan o Paracetamol.**

### **Atención: ¡muy importante!**

**Hasta 4 semanas después de la polipectomía no debe tomar medicamentos que contengan ácido acetilsalisílico:** Estos son, entre otros: Alcacyl, Alka-Seltzer, Asasantin, Aspégic, Aspirina, Aspro 500, Colfarit, Contra-Schmerz, Enterosarine, Febradolor, Fortalidon, Fribagyl, Malex, Neo-Cibalgin, Rhonal, Robaxisal, Silentan, Synthol, Thomapyrin, Togonal ASS 300, Togonal ASS i C, Treupel, Triplex, Upsalgin C, Tiatral, Rumatral, Lyman Tabs.

**¡Estos medicamentos pueden ocasionar un sangrado severo, tan sólo con la toma de 1 comprimido!**