

MAGENDARM THALWIL AG

Spezialärzte Gastroenterologie, Zürcherstrasse 61, 8800 Thalwil
Tel. 044 720 34 35 / FAX 044 720 34 38
praxis@magendarm-thalwil.ch

Merkblatt für Patienten mit Polypektomie

Im Rahmen der Darmspiegelung (Koloskopie) haben wir heute bei Ihnen einen Polypen entfernt. Die Abtragung geschah mittels Schlingenresektion. In diesem Zusammenhang ist wichtig zu wissen:

Nach der Untersuchung und Abtragung können noch leichte Blutspuren auftreten, die sie nicht beunruhigen müssen. **Sollte jedoch eine starke Blutung unabhängig von der Stuhlentleerung auftreten, müssen Sie uns sofort benachrichtigen.**

Wir sind unter folg. Nummern erreichbar:

Praxis 044 720 34 35

Natel 079 158 49 53

Falls Sie mich nicht erreichen, suchen Sie die Notfallstation Ihres nächst gelegenen Spitals auf oder benachrichtigen Sie Ihren Hausarzt, der über den Eingriff bereits orientiert sein sollte.

Als Schmerzmittel erlaubt, falls nötig: Ponstan oder Paracetamol.

Achtung sehr wichtig!

Bis 4 Wochen nach der Polypektomie dürfen Sie keine acetylsalicylsäurehaltigen Medikamente einnehmen: Dies sind u.a. Alcacyl, Alka-Seltzer, Asasantin, Aspégic, Aspirin, Aspro 500, Colfarit, Contra-Schmerz, Enterosarine, Febradolor, Fortalidon, Fribagyl, Malex, Neo-Cibalgin, Rhonal, Robaxisal, Silentan, Synthol, Thomapyrin, Togonal ASS 300, Togonal ASS i C, Treupel, Triplex, Upsalgin C, Tiatral, Rumatral, Lyman Tabs.

Diese Medikamente können schwere Blutungen auslösen. Bereits die Einnahme von 1 Tablette kann genügen!